

Bandera 4OD



Bandera 4OD este un **erbicid** gramicid selectiv, folosit pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale si perene, dar si a unor dicotiledonate, din cultura de **porumb**. **Bandera 4OD** omoara costreii din porumb si are continut de substanta activa - nicosulfuron 40 g/l.

Caracteristici tehnice ale erbicidului Bandera 4OD

- Este absorbit de buruieni prin frunze si partial prin radacini
- Formularea OD - dispersie in ulei
- Aceasta formulare superioara din punct de vedere al performantei biologice imbunatatesta simultan caracteristicile de retentie, umectare si absorbtie in frunza.
- Nu este influentat de ploile ce survin la 4 ore dupa aplicare si nu are efect remanent pentru cultura urmatoare
- Combate foarte bine infestarile puternice cu Sorghum halepense din rizomi

Lista Buruienilor combatute: Costrei din rizomi si din seminte (Sorghum halepense); Pir (Agropyron repens); Iarpa barboasa (Echinochloa crus-galli) –inainte de infratit; mohor (Setaria viridis); Meisor (Digitaria sanguinalis).

Buruieni combatute parțial: Stir (Amaranthus retroflexus); loboda salbatica (Chenopodium album); Zarna (Solanum nigrum); Iarpa rosie (Polygonum persicaria); Ciumafaia (Datura stramonium); Turita (Gallium aparine); Rocaina (Stellaria media); Traista ciobanului (Capsela bursa pastoris); Ridiche salbatica (Raphanus raphanistrum); Mustar salbatic (Sinapis arvensis).

Stadiul omologarilor in Romania		
Cultura	Buruieni combatute	Doza
Porumb	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha postemergent
	-	-
	Costrei din rizomi (Sorghum halepense)	1-1,5 l/ha postemergent

RECOMANDARI DE APLICARE

Erbicidul Bandera 4 OD combate numai buruienile rasarite. Nu se recomanda aplicarea produsului atunci cand cultura de porumb este slab dezvoltata sau trece printr-o perioada de stress.

O singura aplicare:

- 0,8 l/ha pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale atunci cand cultura de porumb este in stadiul de 4-6 frunze iar buruienile in stadiul de 2-4 frunze (inainte de infratire)
- 1-1,5 l/ha pentru combaterea costreielui din rizomi in stadiul de 2-8 frunze ale porumbului

Doua aplicari:

- 1,0 l/ha: inaintea fazei de infratire a gramineelor
- 0,5 l/ha: la reinfestare, dupa 2-3 saptamani.

MOD DE AMBALARE = Bidon 5 Litrii

Produs: BANDERA 4 OD

Substanta activa: nicosulfuron 40 g/l

Formulare: Dispersie in ulei

Clasa toxicologica: Xn