

# Buctril Universal

Substante active: bromoxinil 280 g/l + acid 2,4-D (ester) 280 g/l  
Formulare: EC (concentrat emulsionabil)

## Erbicid postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate

### anuale si perene din culturile de grau si porumb

#### Mod de actiune

Buctril Universal prezinta actiune sistemica si de contact, cu eficacitate ridicata inclusiv asupra buruienilor avansate în vegetatie si a celor perene. Buctril este activ de la 5 grade C si penetreaza in buruieni in mai putin de 1 ora de la tratament (risc scazut de spalare prin precipitatii). Buctril prezinta o selectivitate foarte buna pentru grau si porumb la dozele si momentele de aplicare recomandate.

#### Spectru de combatere

##### Buruieni dicotiledonate anuale

Amaranthus retroflexus (stir), Ambrosia elatior (iarba parloagelor), Anthemis arvensis (musetelul cainelui), Atriplex patula, (loboda), Capsela bursa-pastoris (traista ciobanului), Chenopodium album (spanac salbatic), Datura stramonium (ciumafaie), Galium aparine (turita)\*, Galinsoga parviflora (busuioc salbatic), Hibiscus trionum (zamosita), Lamium purpureum (urzica moarta), Matricaria chamomilla (musetel), Papaver rhoeas (mac salbatic), Polygonum convolvulus (hrisca urcatoare), Polygonum persicaria (iarba rosie), Ranunculus acer (piciorul cocosului), raphanus raphanistrum (ridiche salbatica), Rumex acetosela (stevie), Sinapis arvensis (mustar salbatic), Senecio vulgaris (spalacioasa), Solanum nigrum (zarna), Sonchus asper (susai), Thlaspi arvense (pungulita), Xanthium spp. (cornuti).

\* eficacitate buna pana în stadiul 2 verticile si insuficienta dupa acest stadiu. În caz de infestare puternica se recomanda utilizarea erbicidului Sekator.

##### Buruieni dicotiledonate perene

Cirsium arvense (palamida), Convolvulus arvensis (volbura)

#### Mod de utilizare

**Grau:** 1 l/ha postemergent. Momentul optim de aplicare este între inceputul infratitului si al doilea nod format. Volumul de solutie este de 200-400 l/ha.

**Porumb:** 0,8-1 l/ha, aplicat între stadiile de 4-8 frunze. Pentru combaterea simultana a buruienilor dicotiledonate si monocotiledonate se recomanda tratamentul cu Equip sau Laudis.

### **Avantaje**

- este eficace asupra multor buruieni dicotile anuale si perene din culturile de cereale si porumb
- penetreaza în buruieni în mai puțin de 1 ora (risc scazut de spalare datorita precipitatiilor), cu efecte rapide vizibile în ziua aplicarii
- este activ începând de la temperaturi de 5 grade C
- are o perioada foarte lunga de utilizare la cereale (de la începutul înfratirii pana la sfarsitul împaierii)
- stocurile ramase de la cereale pot fi utilizate ulterior la porumb.