

# Galera Super

( Dow AgroSciences )

**Galera Super**-erbicid postemergent de ultima generatie, cu efect indelungat in combaterea buruienilor dicotile anuale si perene din cultura de rapita.

**Galera Super** se poate aplica:

- **preemergent sau postemergent timpuriu** (stadiul rapiiei 1-3 fiunze) pentru combaterea buruienilor cu rasarire in toamna: Viola arvensis, Papaver rhoeas, Matricaria inodora, Anthemis arvensis; are efect de stagnare pentru Veronica sp.
- **postemergent toamna** la stadiul rapitei de 3 pana la 9 frunze, sau primavara, inainte ca mugurii floralii sa fi vizibili.

**Dozele recomandate:** 0,2 l/ha toamna sau 0,25 l/ha primavara.

Numarul maxim de aplicari: 1 pe cultura.

Volumul de apa utilizat: 200-400 l/ha.

**Galera Super** combate un spectru larg de buruieni dicotiledonate, atat anuale cat si perene: Cirsium arvense, Papaver rhoeas, Matricaria inodora, Galium aparine, Anthemis arvensis, Centaurea cyanus, Viola arvensis, Chenopodium album, Amaranthus spp., Sonchus arvensis, Ambrosia artemisiifolia, Geranium dissectum, Samulastra de floarea soarelui, Polygonum spp, Solanum nigrum.

**Buruieni mediu sensibile:** Stellaria media, Lamium sp., Veronica sp.

Rotatia culturilor

In cazul in care cultura tratata cu Galera Super este calamitata de inghet, daunatori etc., se poate semana pe acelasi teren: rapita de primavara, mustar, varza transplantata, cereale sau porumb, in acelasi sezon, la 1 luna dupa tratament, cu aratul terenului inainte de infiintarea culturii.

Pe un teren care a fost tratat in toamna cu Galera Super pot fi infiintate urmatoarele culturi:

- toamna (anul calendaristic urmitor): cereale, rapita, mustar;

Dupa tratamentul de primavara cu Galera Super se pot infiinta pe acelasi teren urmatoarele culturi:

- in toamna aceluiasi an: rapita de toamna, cereale de toamna,
- in primavara anului urmat: rapita de primavara, mustar, varza, cereale, porumb, sorg, in, sfecla de zahar, sfecla furajera, morcovi, tomate, cartofi, floarea soarelui,
- nu mai devreme de 14 luni de la tratamentul din primavara: soia, mazare, fasole in cazul solurilor sarace in humus sau in conditiile lipsei umiditatii din sol, degradarea produsului este incetinita.