

Descriere

Erbicid postemergent pentru combaterea buruienilor graminee anuale si perene si a unor dicotile din cultura porumbului.

MOD DE ACTIUNE: Este absorbit rapid de frunze si intr-o mai mica masura de radacini, fiind apoi translocat prin planta, contine un adjuvant care asigura o buna absorbtie si rezistenta la spalare.

RECOMANDARI APLICARE: Se va aplica cand buruienile graminee anuale sunt in faza de 1-3 frunze pana la infratit, iar pentru costreiu din rizomi la 15-25 cm inaltime. Rezultate foarte bune la costreiu din rizomi mai ales la infestari medii se obtin aplicand 1.25 l/ha. Pentru infestari puternice si atunci cand sa depasit faza optima se va aplica doza maxima de 1.5 l/ha.

La aplicarea secventiala, primul tratament se aplica cand porumbul are 2-4 frunze si costreiu pana in 15 cm si al doilea la 2-3 saptamani.

Pentru largirea spectrului de combatere a dicotiledonatelor se poate face un tank mixt cu produse specifice.

Cultura	Buruieni combatute	Doza/Momentul aplicarii
Porumb	Costreiu din rizomi (In functie de gradul de infestare)	1-1.5l/ha
	Buruieni monocotilidonate anuale (inclusiv costreiu din seminte)	0.8l/ha
	Costreiu din rizomi	0.75 l/ha+0.5 l/ha tratament secvential

Specificatii Tehnice

Combate Buruieni graminee anuale si perene si a unor dicotiledonate

Formulare SC (suspensie concentrata)

Mod de aplicare Postemergent

Cultura Porumb

Spectru de combatere Costreiu din rizomi

Substanta activa Nicosulfuron 40 g / l