

	Susai (<i>Sonchus</i> spp.), Hrana vacii (<i>Spergula arvensis</i>), Rocoină (<i>Stellaria media</i>)*, Punguliță (<i>Thlaspi arvense</i>), Iarba șarpelui (<i>Veronica hederifolia</i>), Măzăriche (<i>Vicia</i> spp.)	
--	--	--

(*) pentru combaterea speciilor respective se vor aplica dozele mari omologate.

(**) dozele mici se aplică la îmburuienări moderate și/sau cu dominantă speciilor sensibile.

Perioada optimă de aplicare este de la faza de înfrățire până la formarea primului internod, respectiv când buruienile dicotiledonate anuale sunt în faza de 2-4 frunze, dicotiledonatele perene în stadiul de rozetă, iar pălămida are maxim 10 cm înălțime. Erbicidarea se poate face și cu o săptămână înainte de înfrățire, iar dacă se depășește perioada optimă arătată mai sus, se poate face până la faza de intrarea în burduf, dar cu riscul unei eficacități mai reduse, din cauza stadiului mai avansat de creștere și dezvoltare a buruienilor.

TEHNICA DE APLICARE: **RIVAL® STAR 75 GD** se aplică numai cu mijloace de stropit terestre, echipate cu sisteme de agitare permanentă a soluției de stropit, în volume normale de apă (250 – 400 l apă/ha), asigurându-se o acoperire cât mai bună a buruienilor. Tratamentele se fac la temperaturi de peste 5°C, când nu există perspective imediate de ploaie (minim 2 ore) și pe timp liniștit, pentru evitarea împrăstierii produsului pe terenurile sau culturile necerealieră învecinate unde ar putea cauza efecte fitotoxice (R54). În condiții de secetă sau cu temperaturi mai ridicate, se recomandă 500 l apă/ha, iar erbicidarea să se facă, pe cât posibil, în afara orelor cu temperaturi ridicate. Soluțiile de erbicid pregătite pentru erbicidare se folosesc imediat după preparare, ținerea lor mai multe ore sau de la o zi la alta putând determina o reducere semnificativă a eficacității.

COMPATIBILITATE: În funcție de zonă și de starea de îmburuienare a culturilor, pentru combaterea și a unor buruieni monocotiledonate cum sunt: iarba vântului (*Apera spica venti*), odosul (*Avena fatua*), pirul târâtor (*Elymus repens*), **RIVAL® STAR 75 GD** se poate aplica împreună cu unul din erbicidele antigramineice, omologate pentru culturile de cereale păioase. Este compatibil și se poate aplica în amestec cu fertilizantii foliari (cum este **MICROFERT– U**), precum și cu regulatorii de creștere autorizați.

® Marcă înregistrată ALCHIMEX