

Descriere Produs

Erbicid Sekator Progress OD

Substanta activa: amidosulfuron 100 gr/litru+iodosulfuron-metil-Na 25 gr/litru+mefenpyr dietil 250 gr/litru (safener)

Modalitate de ambalare: 1 Litru

Caracteristici: Erbicid sistemic sulfonilureic pentru combaterea buruienilor dicotile anuale si perene si a unor monocotile din culturile de grau, orz, orzoaica de primavara. Sekator este un erbicid cu preluare foliara rapida (in primele 2 ore de la aplicare) si translocare sistemica in intreaga planta. Temperaturile scazute (4-5° C) inainte sau dupa aplicare nu reduc eficienta produsului. Formularea dispersie in ulei (OD) mareste aderenta si viteza de penetrare a erbicidului in frunze, Sekator nefiind spalat de precipitatiile care survin dupa mai mult de 2 ore de la aplicare.

Mod de actiune: Sekator se utilizeaza pentru combaterea buruienilor din culturile de grau, orz, orzoaica de primavara. Doza de utilizare este de 100-150 ml/ha. Doza de 100 ml/ha se aplica atunci cand infestarea cu buruieni nu este puternica. Doza de 150 ml/ha se utilizeaza la infestari puternice precum si impotriva buruienilor dificil de combatut. Tratamentul se efectueaza primavara in postemergenta, faza optima a buruienilor fiind cea de 2-3 frunze. Intervalul optim este intre inceputul si sfarsitul infratirii, dar Sekator poate fi aplicat pana la aparitia frunzei standard fara efecte fitotoxice asupra culturii. Volumul de solutie este de 200-400 l/ha la tratamentul terestru si 80-150 l/ha la tratamentul aerian. **Nota** : la prepararea solutiei, flacoanele se agita bine inainte de golirea in rezervorul instalatiei de stropit.

Atentie: nu se utilizeaza Sekator Progress OD la cultura de ovaz (nu este selectiv pentru ovaz).

Plante tratate: Grau, Orz, Orzoaica de primavara

Buruieni combatute: Amaranthus retroflexus (stir), Ambrosia artemisiifolia (iarba parloagelor), Anagallis arvensis (scanteiuta), Anthemis arvensis (musetelul cainelui), Apera spica venti (iarba vantului): 2-4 frunze, inainte de infratire, Atriplex patula (loboda), Capsella bursa pastoris (traista ciobanului), Centaurea cyanus (albastrele), Chenopodium album (spanac salbatic), Cirsium arvense (palamida); max. 10 cm, Descurainia sophia (voinicica), Galeopsis tetrahit (lungurica), Galinsoga ciliata (busuiocul de camp), Galium aparine (turita), Matricaria chamomilla (musetel), Myosotis arvensis (nu-ma-uita), Polygonum aviculare (troscot), Polygonum convolvulus (hrisca urcatoare), Polygonum persicaria (iarba rosie), Ranunculus arvensis (piciorul cocosului), Raphanus raphanistrum (ridiche salbatica), Rumex ssp. (stevie), Sinapis arvensis (mustarul salbatic), Sonchus arvensis (susai), Stellaria media (rocoina), Thlaspi arvensis (pungulita), Samulastra de rapita, Samulastra de floarea soarelui.

Producator: Bayer

Cultura	Buruieni combatute	Momentul aplicarii	Doza
Grau	Iarba vantului (grau la infratire-formarea primului internod, iarba vantului la 2-4 frunze inainte de infratire)	Postemergent	0.15 l/ha
	Dicotiledonate anuale si perene (grau la infratire, buruieni 2-4 frunze, palamida max. 10 cm inaltime)	Postemergent	0.1-0.15 l/ha
Orz	Dicotiledonate anuale si perene (orz la infratire, buruieni 2-4 frunze, palamida sub 10 cm inaltime)	Postemergent	0.1-0.15 l/ha
Orzoaica de primavara	Iarba vantului (partial) la doza de 0.15 l/ha (orz la infratire, buruieni 2-4 frunze)	Postemergent	0.1-0.15 l/ha