



STARANE 250 EC

Formulare

Certificat Omologare Nr.

Valabil pana la

concentrat emulsionabil

1110/28.03.1986

28.03.2021

Descriere

Caracteristici: erbicid sistemic, cu flexibilitate remarcabila in aplicare, destinat combaterii in postemergenta a buruienilor dicotiledonate din culturile de cereale paioase, porumb, ceapa, livezi si pajisti. Cerlit este cel mai sigur produs, oferind un procent maxim de combatere a *Galium aparine* (turitei) in toate stadiile de crestere. Principalele buruieni combatute: *Galium aparine* (in orice stadiu de dezvoltare), *Galeopsis tetrahit*, *Convolvulus arvensis*, *Rubus spp.*, *Rumex spp.*, *Stellaria media*, *Myosotis arvensis*, *Polygonum spp.*, *Solanum nigrum*, *Vicia spp.*, *Calystegia sepium*, *Bilderdikia convolvulus*, *Lamium spp.*, *Taraxacum officinale*, *Abutilon theophrasti*, *Urtica spp.*, *Portulaca oleracea*, *Equisetum arvense*.

Mod de utilizare: Cerlit este perfect tolerat de cerealele paioase, intr-o fereastră foarte larga de aplicare, primavara de la infratire pana la aparitia spicului. Asigura combaterea excelenta a unor buruieni greu de controlat in cultura porumbului, cum ar fi: *Abutilon theophrasti*, *Convolvulus arvensis*, *Rubus caesius*, *Urtica spp.*, *Taraxacum officinale*. Se aplica in stadiul de 4-6 frunze. Inainte de utilizare este necesara consultarea tabelelor de compatibilitate si efectuarea unui test practic cu respectarea dozelor de amestec. Volumul de apa utilizat pentru prepararea solutiei de stropit: 200-400 l/ha. Cerlit nu afecteaza germinatia semintelor, deci poate fi utilizat cu succes in combaterea buruienilor dicotile din loturile semincere. Doze omologate: grau, ovaz 0,8 l/ha - singur sau 0,4 l/ha asociat; porumb 1 l/ha; pajisti 1 l/ha; mar (livezi pe rod) 1,5 l/ha; ceapa semanata direct 0.6 l/ha. Cerlit poate fi combinat cu ingrasaminte foliare. Pentru completarea spectrului de combatere poate fi combinat cu alte erbicide, inclusive sulfonilureice, DMA Extra 600 SL, Esteron Extra 600 EC, Lontrel 300.

Cultura

Spectru de combatere

Dozaj

grau

turita (*Galium aparine*)

0.8 l/ha postemergent (singur)

grau

volbura (*Convolvulus sp.*)

0.8 l/ha postemergent (singur)

grau

cupa vacii (*Calystegia* + alte dicotiledonate anuale si perene fara *Cirsium arvense*)

0.8 l/ha postemergent (singur)

grau

rocoina (*Stellaria media*)

0.4 l/ha postemergent (asociat cu 2.4 D sau erbicide sulfonilureice din gama RIVAL

ceapa

buruieni dicotiledonate anuale si perene

0.6 l/ha postemergent

mar

buruieni dicotiledonate anuale si perene

1.5 l/ha postemergent

porumb

turita (*Galium aparine*)

1.0 l/ha (singur) postemergent

porumb

volbura (*Convolvulus sp.*)

1.0 l/ha (singur) postemergent

porumb

cupa vacii (*Calystegia* + alte dicotiledonate anuale si perene fara *Cirsium arvense*)

1.0 l/ha (singur) postemergent

ovaz

buruieni dicotiledonate in special Galium, Polygonum spp., Galeopsis, Convolvulus, Calystegia, fara Cirsium cand se aplica singur

0.8 l/ha (aplicat singur)

Concentratie

fluroxipir

250 g/l

Toxicitate

Xn

N