

TENDER

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Mod de actiune: Tender este preluat prin coleoptil in timpul germinatiei semintelor si in cursul perioadei de rasarire, astfel buruienile sunt distruse inainte, in timpul sau imediat pentru rasarire. Preluarea prin radacini este mai redusa decat preluarea prin coleoptil.

Tender este degradabil biologic si nu are restrictie in rotatia culturilor. La o aplicare corecta, **durata de actiune** a produsului este de **4-6** saptamani.

Spectru de activitate: tender este un erbicid ce combate buruienile graminee anuale si unele dicotile din culturile de porumb, sfecla de zahar, floarea-soarelui, soia, fasole de camp, fasole gradina, in tutun, tomate, ardei, ceapa, varza, conopida, vinete, cartof, capsun, arbusti fructiferi, morcovi, pepeni verzi.

Buruieni combatute - buruieni sensibile: meisorul, meisorrosu, mohorul, meiul, iarba barboasa, busuiocul salbatic, iarba vantului, coada vulpii, raigras.- **buruieni moderat sensibile:** stirul, traista ciobanului, iarba grasa, costreiu, sorg furajer, loboda salbatica, trepadatoarea.

Recomandari de aplicare: Asemenea tuturor erbicidelor care actioneaza asupra partilor subterane ale buruienilor, o umiditate suficienta in sol este conditia principala pentru obtinerea unor rezultate bune cu Tender. Precipitatiile sau o irigare dupa tratament inlesnesc patrunderea produsului in stratul superficial al solului. In cazul unei secete prelungite se pot evita riscurile micorarii eficacitatii erbicidului prin incorporare superficiala (cu combinatorul) sau irigare.

Tender, singur sau in amestec, poate fi aplicat pe toate solurile cu exceptia celor extrem de nisipoase ce contin sub 1% substanta organica (humus). Doza de Tender trebuie corectata in functie de continutul de substanta organica a solului, doza superioara la continut ridicat de substanta organica. Se vor asigura conditii optime de pregatire a patului germinativ, fara bulgari si bine maruntit.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Tender se utilizeaza la culturile si in dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZE	EPOCA DE APLICARE
Porumb	buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	1,0-1,5 l/ha	3-4 cm ppi preemergent
Fasole	buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	1,0-1,5 l/ha	preemergent
Soia	buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	1,0-1,5 l/ha	3-4 cm ppi
Floarea soarelui	buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	1,0-1,5 l/ha	preemergent

In de fibra sau ulei	buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale	1-1,5 l/ha	preemergent 3 cm ppi(zone secret)
Tutun	buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale	1,0l /ha	preemergent
Tomate transplatate, tomate semanate direct in camp, fasole de gradina	buruieni anuale monocotiledonate anuale si dicotiledonate	1,0l/ha	preemergent
Ardei gras , varza si conopida de toamna	buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	1,2l/ha	preemergent
Producere rasad de tomate	buruieni monocotiledonate anuale si dicotiledonate	0,25ml/mp	preemergent
capsuni(pentru fructe si stoloni)	buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale din samanta	1,2l/ha	preemergent in 200l apa
arbusti fructiferi (zmeur, mur, afin, coacaz negru)	buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale din samanta	1,2l/ha	preemergent in 300-500 l apa
cartof	buruieni monocotiledonate anuale	1,0-1,5 l/ha	preemergent
sfecla de zahar	buruieni monocotiledonate anuale	1.2-1,5 l/ha	ppi cu incorporare superficiala 1.5l/ha, preemergent
vinete	buruieni monocotiledonate(anuale din seminte) si dicotiledonate	1.2l/ha	preemergent
morcov, pepeni verzi, ceapa, semanata	buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale	0,8-1,0 l/ha	preemergent

direct			
rapita	buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale	1.0-1,5l/ha	preemergent

*ppi - inainte de semanat cu incorporare, in conditii de seceta

*preemergent - dupasemanat, inainte de rasarirea culturii si a buruienilor

Compatibilitate: tender este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare folosite in mod curent in Romania.

Inainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilitate si se va face un test. Intrucat sortimentul de soiuri de plante este in continua schimbare, este indicat ca amestecurile sa fie prealabil testate din punct de vedere al fitotoxicitatii pe soiul care urmeaza a fi tratat.

Pregatireasolutiei: pentru a obtine cea mai buna eficacitate, este important ca Tender sau amestecurile pe loc sa fie aplicate cu presiune joasa si cu un volum de 150-600 litri/ha de apa.