



VECTOR

Formulare

Certificat Omologare Nr.

Valabil pana la

suspoemulsie

1862/29.09.1998

29.09.2018

Descriere

Caracteristici: este un erbicid sistemic postemergent, destinat combaterii buruienilor cu frunza lata din culturile de cereale paioase si porumb. Erbicidul asigura combaterea totala a turitei (*Galium aparine*) si musetelului (*Matricaria* spp.) chiar si in stadii avansate de dezvoltare. Are o eficacitate foarte buna si in combaterea palamidei (*Cirsium arvense*) plus alte peste 100 de specii de buruieni cu frunza lata frecvente in culturile cerealiere, printre care: *Amaranthus* spp., *Ambrosia artemisiifolia*, *Anthemis arvensis*, *Atriplex* spp., *Brassica* spp., *Centaurea cyanus*, *Chenopodium* spp., *Helianthus annuus*, *Papaver rhoeas*, *Polygonum* spp., *Sonchus* spp., *Stellaria media*. Mustang penetreaza foarte rapid suprafata foliara a buruienilor, migrand spre punctele de crestere ale acestora. Opreste cresterea buruienilor in 24 de ore.

Produsul se aplica primavara la temperaturi de peste 5°C, spre deosebire de produsele standard, care devin active numai de la temperaturi de peste 8-10°C. La cereale paioase MUSTANG are o fereastra foarte larga de aplicare putand fi folosit de la inceputul infratirii pana la formarea a 2 internodii.

Mustang este mai putin dependent de temperatura decat majoritatea erbicidelor, componentele sale devenind active chiar de la temperaturi de 5°C. Este perfect tolerat atat de cerealele de toamna cat si de cele de primavara.

Mod de utilizare: se utilizeaza pentru combaterea buruienilor cu frunza lata din culturile de cereale. Pentru o combatere eficienta a buruienilor (peste 95%) se recomanda aplicarea in primele faze de vegetatie a acestora. Doza omologata este de 0,4 - 0,6 l/ha, diluat in 200 - 400 l apa/ha. Mustang poate fi administrat concomitent cu fungicide, insecticide, o gama larga de graminicide, ingrasaminte foliare. In cazul amestecului cu alte produse este de preferat efectuarea unui test practic, respectandu-se dozele prescrise.

Cultura

Spectru de combatere

Dozaj

grau

buruieni dicotiledonate anuale si perene (Cirsium arvense, Chenopodium spp., Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Sinapis arvensis, Stellaria media etc.)

0.4 - 0.6 l/ha postemergent

orz

buruieni dicotiledonate anuale si perene (Cirsium arvense, Chenopodium spp., Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Sinapis arvensis, Stellaria media etc.)

0.4 - 0.6 l/ha postemergent

porumb

buruieni dicotiledonate anuale si perene (Cirsium arvense, Chenopodium spp., Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Sinapis arvensis, Stellaria media etc.)

0.4 - 0.6 l/ha (functie de gradul de infestare, inaltime si dominanta buruienilor) postemergent

orzoaica

buruieni dicotiledonate anuale si perene (Cirsium arvense, Chenopodium spp., Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Sinapis arvensis, Stellaria media etc.)

0.4 - 0.6 l/ha postemergent

ovaz

buruieni dicotiledonate anuale si perene (Cirsium arvense, Chenopodium spp., Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Sinapis arvensis, Stellaria media etc.)

0.4 - 0.6 l/ha postemergent

Substanta Activa

Concentratie

florasulam

acid 2

4 D din 2 etilhexil ester

6.25 g/l

300 g/l

Toxicitate

Xn

N