

Elumis



Elumis

Ultima actualizare:
17.02.2017

ERBICID

Produs
protecția
plantelor

Ambalaj:

20 litri

Compoziție:

75 g/l

mesotrione

30 g/l

nicosulfuron

Familia Chimică:

Calistemone

Sulfonilureice

Formulare:

suspensie în ulei

Elumis are acțiune multiplă, în principal foliară, dar și la sol, radiculară și antigerminativă, ceea ce-l recomandă împotriva buruienilor greu de combătut.

Elumis este un erbicid consacrat pentru combaterea buruienilor graminee anuale și perene, precum și a buruienilor cu frunza lată, anuale și perene, din cultura porumbului.

Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)
- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

Cultură

- Oricare - ▼

Porumb

Clasificare

ATENȚIE

Fraze de precauție	<ul style="list-style-type: none">• P273: Evitați dispersarea în mediu.• P391: Colectați scurgerile de produs.• P501: Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii	<ul style="list-style-type: none">• Echipament de protecție necesar: mănuși Tip SR EN 374 (din cauciuc nitrilic de minim 0,40 mm grosime), ochelari de protecție cu apărători laterale (de Tip EN 166 factor de protecție 5 sau echivalent), costum de protecție standard (costum Tip 6). Purtați de câte ori este posibil două rânduri de îmbrăcăminte (Salopetă din bumbac sau poliester sub costumul de protecție chimică)! Nu este necesară utilizarea unui echipament respirator de protecție individuală pentru lucrări de scurtă durată dacă s-au luat măsuri de ventilare corespunzătoare.

**Alte
restricții
de
utilizare**

Nu aplicați Elumis la loturile de hibridare de porumb.
Nu aplicați Elumis la porumbul tratat cu insecticide de sol organofosforice.
Nu amestecați Elumis cu fertilizanți foliari sau îngrășăminte lichide.
Nu aplicați în amestec cu alte erbicide sulfonilureice sau în sole tratate cu acest tip de produse.
În anumite condiții, după tratamentul cu Elumis pot apărea simptome tranzitorii de îngălbenire și/sau limitarea creșterii culturii la un interval de 1- 2 săptămâni de la aplicare. Acestea sunt rapid depășite, nefiind observate efecte negative asupra producției.
Aplicarea nu se recomandă la culturile aflate în stres: atac de dăunători, temperaturi scăzute, exces de umiditate sau secetă.
Evitați aplicarea produsului la temperaturi mai mici de 10°C sau mai mari de 25°C.
Evitați ajungerea soluției pe alte culturi învecinate.

Compatibilitate

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. Nu amestecați Elumis cu erbicide pe bază de bromoxil.

Pregătirea soluției

ATENȚIE: Agitați bine recipientul înainte de folosirea produsului! Umpleți rezervorul pe jumătate cu apă curată și porniți circuitul de agitare. Adăugați cantitatea corespunzătoare de erbicid continuând agitarea, apoi completați cu restul de apă. Continuați agitarea înainte și pe tot timpul aplicării.

Volum apă

150-400 litri /ha

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00
-